

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 28-6-65 522738

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 12 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU MIDI (Tél. 52.73.20)

(ARIÈGE, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT, HAUTES-PYRÉNÉES,  
TARN, TARN-ET-GARONNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 11, rue de la Plage - TOULOUSE.  
C. C. P. : TOULOUSE 8614-19

Abonnement Annuel

15 F, 00

- Supplément n° 3 au bulletin n° 69

1966 - 17

## - A V E R T I S S E M E N T S -

### VIGNE

- Mildiou : Le régime pluvieux persistant demeure favorable à la maladie alors que l'on se trouve encore en période de sensibilité de la vigne. Dans toutes les cultures envahies, poursuivre la protection selon les indications du précédent bulletin, notamment en ce qui concerne le dosage des produits.
- Black-rot : Une abondante sortie de taches (contaminations primaires et secondaires) est en cours. Dans les vignes atteintes où le traitement dirigé contre le Mildiou n'est pas indispensable, effectuer une application contre le Black-rot.

### ARBRES FRUITIERS

- Carpocapse (Ver des pommes et des poires) : La période des pénétrations importantes des jeunes chenilles de première génération est terminée. Cependant, dans les secteurs très sensibles au carpocapse (voisinage d'agglomération ou d'entrepôts) un traitement pourrait encore être effectué d'autant plus que celui précédemment conseillé a pu être "lavé" par les dernières chutes de pluies, dans certaines localités.
- Tordeuse Orientale du pêcher : Le second vol de papillons est commencé et les premières attaques d'une certaine importance sur pêche risquent de se produire à partir des tout derniers jours du mois.

En conséquence, sur toutes les variétés mûrissant entre le 15 Juillet et la fin du mois d'Août, appliquer à partir du 28 Juin un traitement très soigné de type préventif.

Dans les zones très sensibles au ravageur et sur les variétés mûrissant après le 8 Juillet, on pourrait intervenir avec un produit à base de Mévinphos (à raison de 50 g. M.A/hl) soit le 30 Juin, soit le 1er Juillet au plus tard.

En pépinière ou sur les jeunes arbres en formation, appliquer un traitement préventif à partir du 28 Juin.

- Tavelures du poirier et du pommier : Dans de nombreux vergers, des taches existent en plus ou moins grande abondance. Dans tous ces cas, le temps demeurant pluvieux, il est nécessaire de poursuivre la protection.

## - I N F O R M A T I O N S -

### VIGNE

- Oïdium : Effectuer un traitement par poudrage ou bien ajouter un anti-oïdium aux bouillies destinées à combattre le Mildiou ou le Black-rot.

P./.../100

#### ARBRES FRUITIERS

- Psylle du poirier : Des insectes sont en nette recrudescence d'activité depuis quelques temps. Dans les vergers habituellement attaqués, choisir pour le combattre un produit également efficace contre le Carpocapse.

#### CULTURES LEGUMIERES

- Melons : En raison de la persistance d'un temps instable, poursuivre la protection dans les conditions indiquées dans le précédent bulletin.
- Tomate : Contre les attaques d'*Alternaria* et de Mildiou on pourrait traiter préventivement avec un produit à base de Manèbe.
- Pomme de terre : Contre le Mildiou, dans les cultures de plein champs, il serait prudent d'effectuer un nouveau traitement.

TOULOUSE, le 23 JUIN 1966

Les Contrôleurs chargés des  
Avertissements Agricoles

J. BESSON - E. JOLY

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux

L. IMBERT

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles du Midi  
Le Directeur - Gérant : L. BOUYX